








Fysioterapeutisk behandling af børn med dysfunktionel vandladning

Dysfunktionel vandladning

Dysfunktionel vandladning karakteriseret ved ufrivillige sammentrækninger af enten den urethral sphincter eller bækkenbundsmuskulaturen under blæreudtømmning.



Graphic representation of various uroflow patterns. **A**, Superflow commonly seen with poor urethral resistance. **B**, Intermittent multiple-peak pattern. **C**, Intermittent interrupted pattern. **D**, Abnormal flow rate characteristic of detrusor outlet obstruction.

Børn med...



dysfunktionel
vandladning



- resturin +/- UVI



- dag-inkontinens

Standard uroterapi


- forstoppelse
- toilet tider
- væske indtag
- siddestilling på toilettet
- dobbelt voiding



BESVÆRLIGE HUSREGLER

COPYRIGHT : MORT

Vurdering af barnets kropsbevidsthed og koordination



Bækkenbundens
spændingstilstand
er påvirket af andre
muskler i kroppen

Der fokuseres især på
mavemuskulaturen
åndedrætsmusklerne


Test af muskulaturen

- m. transversus abdominus
- m. diafragma

Formålet
at øge
barnets
bevidsthed
om spænding
kontra
afspænding

Lukkemuskulaturen

- bækkenbundes anatomi og funktion
- hvor sidder musklerne i fht. blæren
- hvad sker der, når man tisser




Bækken- bunden

Test af funktion

- kontraktionen
 - ingen bevægelse
 - lille snøring og løft
 - kraftig snøring og løft
- afspændingen
- bugpres




MMS- biofeedback



MMS –biofeedback Med uroflw





Måling af resturin



Typisk forløb



1.gang- undersøgelse og start på tr



2.gang- test med Biofeedback-com



3.4.5. gang- træning og fortsatte te
afhængig af progression



hver gang vandladning på flowtoile
med Biofeedback og scanning for r



foregår i en periode på 3-6 mdr.

Slut

